

活力沛® TKO 296 *TKO Phosphite 0-29-26*

誘導植物增強抗病力，使組織厚實、抑制徒長現象，減少病害發生 !!

□ **成份：** 水溶性磷酐 ----- 29 % 水溶性氧化鉀 ----- 26 %

□ **特性：**

- 1980 年起，由於對「福賽得 Aluminium ethyl phosphite」殺菌機制之研究，發現其代謝產物中的「亞磷酸 Phosphite」為主要的抑病物質。植物在施用「亞磷酸」後，會產生「植物防禦素 Phytoalexin」抵抗疫病菌或其他卵菌綱等病原菌入侵，為期長達數週以上。「亞磷酸」此種非農藥防治機制稱為「誘導系統性抗病」，為廣義的非農藥防治法之一。
- **活力沛® TKO 296** 為最高成份的「亞磷酸」，品質穩定、用量少，具有系統移行性，能迅速誘導植物產生抗體，廣效的降低腐疫病、露菌病類所引起的病害，且時效長、無抗藥性、不會傷害土壤有益微生物及敗壞土壤。
- **活力沛® TKO 296** 含高成份的磷鉀肥，可促進植物開根發芽、莖葉厚實及抑制徒長現象。

□ **使用方法：**

- 番茄、彩椒、瓜果、蔬菜類等：於定植後每分地施用 0.2~0.4 公升，作葉面或滴灌噴灑，視需要每 1~2 週施用乙次。
- 草莓：自開花期起，每分地施用 0.2~0.4 公升 (稀釋 800 倍以上)，作葉面或滴灌噴灑，每月施用乙次，共 4 次。
- 芒果、葡萄、蘋果、梨、柑橘等果樹：每公頃施用 2~4 公升，稀釋 800~1500 倍噴灑。自發新芽或開花前開始施用，每 2-4 週施用乙次。
- 可與其他肥料、農藥混合使用。雨季前每 2 週施用乙次，連續 2~3 次；病害嚴重時，配合活力沛 GB03 或其他殺菌劑如貝芬替、免賴得、甲基多保淨使用，效果更佳 (參考注意事項)。

□ **注意事項：**

- 請置於陰涼通風的場所並密封瓶口。不可冷藏或置於陽光下暴曬。使用前請先搖晃均勻。
- 避免在中午高溫時噴灑藥劑。請勿於下雨或灌溉前後立即施用，避免藥劑流失。**不可與礦物油、銅劑、強酸、強鹼性等藥劑混合。**

- 不可與銅劑混合使用，且施用 活力沛® TKO 296 前後 2 週內不宜使用 銅劑。
- 與其它產品混合時，先於容器中加約一半的水，將 活力沛® TKO 296 稀釋後，再依序加入其他粉劑、水劑、肥料，同時逐漸加水攪拌。

使用方法及使用量：


蔬果類	使用量 公撮/分地	使用時機		
		第一次	第二~三次	後續
茄科如蕃茄、彩椒等 瓜類如洋香瓜、西瓜、黃瓜、苦瓜等	200 ~ 400	定植後或植株達 2 片本葉時	每 1~2 週施用乙次	視狀況需要
草莓	200 ~ 400	定植後	每月施用乙次	視狀況需要
花椰菜、甘藍、結球白菜、高麗菜等	200 ~ 400	定植後或植株達 2 片本葉時	每 1~2 週施用乙次	視狀況需要
胡蘿蔔、洋蔥、薑、蔥、蒜、韭菜等	200 ~ 400	定植後或植株達 2 片本葉時	每 1~2 週施用乙次	視狀況需要

果樹類	使用量 公撮/分地	使用時機	
		第一次	後續
蘋果、梨、桃、李	200 ~ 400	新芽萌發	視狀況需要，每 3~4 週施用乙次
葡萄	200 ~ 400	開花初期	著果、小果期至採收前 2~3 週，視狀況需要施用
柑橘類	200 ~ 400	開花前	中果期至採收前 3~4 週或視狀況需要施用

包裝：美國原裝進口 1 公升 x 12 瓶 /箱、10 公升 x2 桶/箱

比重：12.5 磅 / 加侖

製造廠：GROWTH PRODUCTS, LTD. 80 LAFAYETTE AVE, WHITE PLAINS, NY10603, USA.

總代理： 喜世傑興業有限公司 電話：02-82722 3889 傳真：02-2722 2668